

# RONDOCHOC VRAC

Produit rodenticide anticoagulant à base de difénacoum.

r des professionnels

. : FR-2013-0069

onnement 5 et 20 kg

## 1. COMPOSITION :

0,005% de difénacoum (antidote : vitamine K1). Avoine décortiquée de couleur bleue comportant des agents d'appétence alimentaire et un agent amérissant à titre de précaution vis à vis des enfants et des animaux domestiques.

## 2. MODE D'ACTION :

Le difénacoum est un anticoagulant. Les rongeurs meurent d'hémorragies internes suite à une ingestion répétée. L'effet retard de cette molécule permet de contourner la méfiance des rongeurs. Les cadavres se dessèchent et sentent rarement.

## 3. MODE D'EMPLOI :

Porter des gants. Déposer dans des postes d'appâtage sécurisés, 40g pour des souris et 200g pour des rats. Espacer les postes de 1 à 2 mètres pour des souris, de 5 à 10 mètres pour des rats. Les postes doivent être placés le long des chemins empruntés par les rongeurs et dans les endroits les plus fréquentés. Inspecter et réapprovisionner les postes quelques jours après la première application puis une fois par semaine. Tant que l'appât est consommé. Ne pas nettoyer les postes entre deux applications. Ramasser les sachets restants, les détruire conformément à la réglementation en vigueur. Ramasser les cadavres, les enterrer ou les envoyer à l'équarrissage (à partir de 40kg). Les symptômes apparaissent 36 h après l'ingestion et les rongeurs meurent en 4 à 10 jours. Retirer tous les postes après la fin du traitement.

Alternier les produits ayant des substances actives avec des modes d'action différents afin d'éviter l'apparition de phénomènes de résistance. Adopter des méthodes de gestion intégrée telles que la combinaison de méthodes de lutte chimique, physique et mesures d'hygiène. Vérifier l'efficacité du produit sur site : le cas échéant, les causes de diminution d'efficacité doivent être recherchées afin de s'assurer de l'absence de résistance. Ne pas utiliser les produits dans des zones où les cas de résistance sont suspectés ou établis.

## 4. PRECAUTIONS D'EMPLOI :

Le produit ne peut être utilisé que dans des postes d'appâtage sécurisés.

Les postes doivent être placés de manière sûre pour minimiser les risques d'accès au produit et d'ingestion par des enfants ou des animaux non cibles. S'assurer que les boîtes sont correctement fermées pour éviter que les appâts ne soient sortis des postes par les rongeurs. Ne pas traiter les surfaces et les ustensiles qui pourraient être en contact avec des aliments afin d'éviter toute contamination des aliments destinés à la consommation humaine et animale.

Ne pas rejeter le produit dans l'environnement ou les canalisations.

## 5. ANTIDOTE

RONDOCHOC contient un rodenticide anticoagulant, un traitement à la vitamine K1 pourrait être nécessaire pendant une longue période.

Centre antiposon : INRS 01.45.42.59.59

